

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não existem relatos de reações adversas na utilização de STODAL.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não existem relatos de casos de superdosagem durante a utilização do medicamento STODAL.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

DIZERES LEGAIS

MS - 1.6916.0003.001-3

Farmacêutica Responsável:

Dra. Thaise de Siqueira Dal Mas Dias

CRF-SP no. 90.975

Fabricado por:

BOIRON S.A.

2, avenue de l'Ouest lyonnais

69510 Messimy - FRANÇA

Registrado, importado e Distribuído

por:

BOIRON MEDICAMENTOS

HOMEOPÁTICOS LTDA

Rua Joaquim Floriano,

1120 conj. 41 - 04534-000

São Paulo - S.P. CNPJ

07.498.711/0001-87

www.boiron.com.br

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 20/02/2019.



BOIRON®



Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 724 5858

STODAL

Drosera 3 CH + Associação MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

APRESENTAÇÕES

STODAL xarope, em frasco de vidro de 150 ml.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Drosera 3 CH	10 ml
Arnica montana 3 CH	10 ml
Belladonna 3 CH	10 ml
Cina 3 CH	10 ml
Coccus cacti 3 CH	10 ml
Corallium rubrum 3 CH	10 ml
Cuprum 3 CH	10 ml
Ferrum phosphoricum 3 CH	10 ml
Ipeca 3 CH	10 ml
Solidago virga aurea 1 CH	10 ml
Excipientes q.s.p	100 ml

Excipientes: benzoato de sódio, ácido cítrico monohidratado, solução de sacarose e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

STODAL é indicado como auxiliar no tratamento da tosse seca ou produtiva; por promover o alívio da irritação da garganta ou por diminuir a viscosidade das secreções facilitando a expectoração.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas

conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

As substâncias utilizadas na fabricação dos medicamentos homeopáticos são experimentadas em indivíduos sadios e desenvolvem determinados sinais e sintomas que revelam seu potencial medicamentoso. A preparação em doses mínimas dos medicamentos homeopáticos, a partir dessas substâncias, objetiva a ação inversa à provocada na experimentação.

A Homeopatia está baseada na Lei da cura que afirma: “O semelhante pode curar o semelhante”. Assim, as substâncias que provocam estes sintomas da tosse, são utilizadas em doses homeopáticas para auxiliar o tratamento deste distúrbio.

A ação do medicamento homeopático é imediata, as doses devem ser repetidas até o desaparecimento completo dos sintomas.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar este produto se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de interações de STODAL com outros medicamentos ou alimentos.

Atenção diabéticos: Este medicamento contém SACAROSE (Açúcar).

Este medicamento contém:

- 2,1 g de sacarose por dose de 2,5 ml;
- 4,2 g de sacarose por dose de 5 ml;
- 12,6 g de sacarose por dose de 15 ml.

Consulte seu médico caso você tenha doença crônica dos brônquios ou dos pulmões.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve armazenar **STODAL** em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Solução límpida de coloração amarelo claro.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletro magnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Posologia sugerida:

Você deve utilizar o copo-medida nas doses indicadas abaixo:

Adultos: você deve tomar, por via oral, 1 dose de 15 ml 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças maiores de 5 anos: você deve administrar à criança, por via oral, 1 dose de 5 ml 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças menores de 5 anos: você deve administrar à criança, por via oral, 1 dose de 2,5 ml 2 a 3 vezes ao dia.

No caso de adultos, não utilizar mais que 45 ml por dia.

No caso de crianças maiores que 5 anos, não utilizar mais que 15 ml por dia.

No caso de crianças menores que 5 anos, não utilizar mais que 7,5 ml por dia.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 5 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar os sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode administrar **STODAL** assim que se lembrar. Não exceda a dose recomendada para cada dia.